


Захистіть дитину від коклюшу

Чому вагітним жінкам радять вакцинуватися проти коклюшу?



- Коклюш — це респіраторна інфекція, яка може викликати серйозні захворювання у маленьких дітей. Невакциновані немовлята віком до 1 року піддаються найбільшому ризику важких захворювань.
- Вакцинація під час вагітності захищає дитину від коклюшу від народження до першої дози вакцини у віці 3 місяців.
- Вакцина проти коклюшу рекомендована вагітним жінкам у більшості країн світу і забезпечує немовлятам надійний захист від коклюшу.



Як працює вакцина?

- Вагітні жінки, які отримують вакцину, виробляють захисні антитіла проти коклюшу. Ці антитіла передаються дитині в утробі матері.
- Щоб ваша дитина отримала захист, ви повинні отримати вакцину під час вагітності, незалежно від того, коли вас востаннє вакцинували проти коклюшу.

Під час та після вакцинації



- Вакцина рекомендована на 24-му тижні пренатального обстеження.
- Вакцина вводиться у вигляді ін'єкції в плече.
- Це нормально, що ваше плече може трохи боліти, а також може почервоніти або набрякнути. У деяких людей може розвинути лихоманка, біль у м'язах, вони можуть відчувати себе нездоровими або втомленими. Зазвичай це проходить самостійно протягом декількох днів.
- Не було доведено, що у дитини виникають побічні ефекти, коли мати вакцинується проти коклюшу під час вагітності.
- Зверніться до медичного працівника, якщо у вас виникли запитання або ви занепокоєні дискомфортом/недугою після вакцинації.